

**ONTEM, HOJE E SEMPRE NA
AGRICULTURA DO AMANHÃ**



LINHA DE PRODUTOS PARA PROTEÇÃO 2025



Com mais de 70 anos de história,
a Nortox reafirma seu compromisso com o agricultor
brasileiro, oferecendo produtos de alta qualidade
que impulsionam a eficiência no agronegócio.





abamectin 72 EC**Abamectina EC****72 g a.i./L**

Inseticida e acaricida de ação de contato e ingestão do grupo químico das avermectinas, indicado para o controle de importantes pragas causadoras de danos nas culturas do algodão, batata, café, citros, coco, crisântemo, duboisia, feijão, maçã, melancia, morango, pepino, pimentão, roseira, soja e tomate.

abamectin 400 WG**Abamectina WG****400 g a.i./kg**

Acaricida, inseticida e nematocida de ação de contato e ingestão do grupo químico das avermectinas, indicado para as culturas do algodão, batata, café, cana-de-açúcar, citros, feijão, mamão, milho, soja, tomate e uva.

atabron ultra**Clorfluazurom SC****100 g a.i./L**

Inseticida que atua como regulador de crescimento de insetos, pois é um inibidor da quitina. Deve ser utilizado em pulverização nas seguintes culturas: algodão, amendoim, aveia, batata, brócolis, cana-de-açúcar, centeio, cevada, citros, couve, couve-chinesa, couve-de-bruxelas, couve-flor, ervilha, feijão, grão-de-bico, lentilha, milheto, milho, repolho, soja, sorgo, tomate, trigo e triticale.

bifentrina 100 EC**Bifentrina EC****100 g a.i./L**

Inseticida e acaricida do grupo químico piretroide com modo de ação de contato e ingestão. Indicado para o controle dos alvos biológicos que causam danos às culturas de abacate, abacaxi, algodão, amendoim, anonáceas, aveia, azeitona, batata, cacau, caju, cana-de-açúcar, caqui, carambola, centeio, cevada, citros, crisântemo, cupuaçu, duboisia, eucalipto, feijão, feijões, figo, fumo, goiaba, grão-de-bico, guaraná, kiwi, lentilha, lichia, macadâmia, mamão, manga, mangaba, maracujá, melancia, melão, milheto, milho, noz-pecã, pastagem, romã, rosa, soja, sorgo, tomate, trigo, triticale e uva.

bifentrina A**Bifentrina + Acetamiprid SL****67 + 100 g a.i./L**

Inseticida de uso foliar de amplo espectro de ação pertencente aos grupos químicos dos neonicotinóides e piretroides para o controle de pragas nas seguintes culturas: amendoim, algodão, arroz, aveia, batata, centeio, cevada, citros, ervilha, feijão, feijões, grão-de-bico, lentilha, milheto, milho, soja, sorgo, tomate, trigo e triticale.

cipermetrina 250 EC**Cipermetrina EC****250 g a.i./L**

Inseticida do grupo químico piretroide que possui ação de contato e ingestão sobre os alvos biológicos que causam danos às culturas do algodão, amendoim, arroz, aveia, batata, batata-doce, batata yacon, beterraba, café, cará, cenoura, centeio, cevada, citros, ervilha, feijão, feijões, grão-de-bico, inhame, lentilha, mandioca, mandioquinha-salsa, milheto, milho, soja, sorgo, tomate, trigo e triticale.

clorfenapir**Clorfenapir SC****240 g a.i./L**

Inseticida e acaricida de contato e ingestão, do grupo químico análogo de pirazol, indicado para o controle dos alvos biológicos causadores de danos nas culturas de acerola, algodão, alho, amora, amendoim, batata, berinjela, cebola, chalota, citros, crisântemo, ervilha, eucalipto, feijão, feijões, framboesa, grão-de-bico, jiló, lentilha, melancia, milheto, milho, mirtilo, morango, pimenta, pimentão, pitanga, quiabo, rosa, siriguela, soja, sorgo e tomate.

clorpirifós EC**Clorpirifós EC****480 g a.i./L**

Acaricida e inseticida do grupo químico organofosforado que age por contato e ingestão no controle dos alvos biológicos presentes nas culturas de algodão, amendoim, aveia, batata, café, centeio, cevada, citros, ervilha, feijão, feijões, grão-de-bico, lentilha, maçã, milheto, milho, pastagens, soja, sorgo, tomate, trigo e triticale.

diafentiurom**Diafentiurom SC****500 g a.i./L**

Inseticida e acaricida de contato e ingestão do grupo químico feniltioureia. Indicado para o controle dos alvos biológicos que causam danos econômicos às culturas de algodão, café, feijão, soja e tomate.

eforia**Tiametoxam + Lambda-cialotrina****141 + 106 g a.i./L**

Inseticida sistêmico, de contato e ingestão com registro para as culturas de amendoim, arroz, batata, cebola, feijão, milho, pastagens, pepino, soja, sorgo, tomate e trigo.

fipronil 800 WG**Fipronil WG****800 g a.i./kg**

Inseticida e cupinicida do grupo químico pirazol que age por contato e ingestão nos alvos biológicos causadores de danos às culturas de batata, cana-de-açúcar, duboisia, milho e soja.

fipronil max**Fipronil SC****500 g a.i./L**

Inseticida e cupinicida do grupo químico pirazol que age por contato e ingestão nos alvos biológicos causadores de danos às culturas do algodão, arroz, arroz irrigado, batata, cana-de-açúcar (planta e soca), eucalipto, feijão, milho, pastagem, soja e trigo.



imidacloprid



Imidacloprido SC

480 g a.i/L

Inseticida sistêmico do grupo químico neonicotinoide que age nos alvos biológicos que causam danos às culturas do algodão, citros, fumo, milho, pastagem, soja e tomate; em tratamento de sementes nas culturas do algodão, arroz, arroz irrigado, feijão, milho e trigo e em sulco de plantio da cana-de-açúcar.

lambda-cialotrina



Lambda-cialotrina CS

250 g a.i/L

Inseticida do grupo químico diamida que atua por contato e ingestão. É indicado para o controle de insetos mastigadores nas seguintes culturas: algodão, amendoim, aveia, cana-de-açúcar, centeio, cevada, ervilha, feijão, milho, milho, soja, sorgo, tomate, trigo e triticale.

lufenuron 100 EC



Lufenuron EC

100 g a.i/L

Inseticida fisiológico do grupo químico benzoilureia indicado para o controle dos alvos biológicos causadores de consideráveis danos econômicos às culturas de abóbora, abobrinha, algodão, ameixa, aveia, açaí, batata, brócolis, café, cana-de-açúcar, canola, castanha-do-pará, centeio, cevada, chuchu, citros, coco, couve, couve-chinesa, couve-de-bruxelas, couve-flor, dendê, eucalipto, gergelim, girassol, linhaça, mamona, marmelo, maçã, maxixe, milho, milho, nectarina, nêspera, noz-pecã, pepino, pêra, pêssego, pinhão, pupunha, repolho, soja, sorgo, tomate, trigo e triticale.

metoxifenoze



Metoxifenoze SC

240 g a.i/L

Inseticida pertencente ao grupo químico da diacilhidrazina (agonista de receptores de ecidisteróides) que atua como acelerador de ecidise imitando a ecidisona (hormônio natural da muda dos insetos), ligando-se fortemente a esta proteína receptora, ativando-a e iniciando o processo da muda denominado ecidise, agindo especificamente sobre larvas de lepidópteros (lagartas) que param de se alimentar e produzem uma nova, porém mal formada, cutícula por baixo da antiga, morrendo por inanição e desidratação. É indicado no controle de pragas de significativa importância econômica nas culturas de algodão, feijão, maçã, milho, soja, tomate e trigo.

piriproxifen



Piriproxifen EC

200 g a.i/L

Inseticida fisiológico juvenil, regulador de crescimento de insetos do grupo químico éter piridiloxipropílico. Indicado para o controle dos alvos biológicos causadores de danos nas culturas de algodão, amendoim, café, caju, citros, ervilha, feijão, feijões, figo, gérbera, goiaba, maçã, melancia, melão, rosa, soja, tomate e uva.

typhoon



Clorantnilprole + Metomil OD

21,5 + 215 g a.i/L

Inseticida de uso foliar de amplo espectro que atua por contato e ingestão, sendo indicado no controle de pragas que causam consideráveis danos à produção das culturas do milho, milho e sorgo.

azoxistrobin



Azoxistrobina SC

250 g a.i/L

Fungicida de ação sistêmica do grupo químico das estrobilurinas que atua através de mobilidade translaminar e lateral com ação predominantemente preventiva, mas também curativa. Seu mecanismo de ação consiste na inibição extracelular de quinona. É utilizado em ação preventiva para o controle dos alvos biológicos indicados, os quais causam consideráveis danos à produção das culturas de algodão, amendoim, arroz, arroz irrigado, aveia, banana, batata, café, cana-de-açúcar, centeio, cevada, citros, ervilha, feijão, feijões, grão-de-bico, lentilha, milho, milho, soja, sorgo, tomate, trigo e triticale.

boscalid 500 WG



Boscalida WG

500 g a.i/kg

Fungicida sistêmico do grupo anilida, caracterizado pelo mecanismo de ação denominado "inibidores da respiração celular", atua sobre todos os estágios de desenvolvimento e reprodução do fungo, tais como inibição da germinação dos esporos, desenvolvimento e penetração dos tubos germinativos, crescimento micelial e esporulação. É indicado para o controle de doenças nas culturas da acelga, acerola, alface, alho, almeirão, amora, batata, berinjela, café, cebola, cenoura, chicória, crisântemo, espinafre, feijão, framboesa, jiló, melancia, melão, morango, mostarda, pimenta, pimentão, quiabo, rosa, seriguela e tomate.

ciproconazole



Ciproconazol SL

100 g a.i/L

Fungicida sistêmico do grupo químico dos triazóis, caracterizado pelo mecanismo de ação denominado IBE (Inibidor da Biossíntese do Ergosterol). Apresenta ação preventiva e curativa no controle de diversos alvos biológicos, os quais causam consideráveis danos à produção das culturas de alho, café, crisântemo, goiaba, maçã, melancia, melão, pêssego, soja, trigo e uva.

difenoconazol 250 EC



Difenoconazol EC

250 g a.i/L

Fungicida sistêmico do grupo dos triazóis, caracterizado pelo mecanismo de ação denominado IBE (Inibidor da Biossíntese do Ergosterol). É indicado para as culturas do abacate, abobrinha, alamo, alface, algodão, alho, amendoim, arroz, banana, batata, berinjela, beterraba, café, cebola, cenoura, citros, coco, couve-flor, ervilha, feijão, girassol, maçã, mamão, manga, maracujá, melancia, melão, milho, morango, pepino, pimentão, rosa, soja, tomate e uva.

fluazinam 500 SC



Fluazinam SC

500 g a.i/L

Fungicida e acaricida, do grupo químico das fenilpiridimilaminas, indicado para aplicação por meio de pulverização nas culturas de acerola, algodão, alho, ameixa, amendoim, amora, azeitona, batata, cana-de-açúcar, canola, cebola, chalota, ervilha, feijão, feijões, framboesa, gergelim, girassol, grão-de-bico, lentilha, linhaça, maçã, mamona, marmelo, mirtilo, morango, nectarina, nêspera, pera, pêssego, pitanga, seriguela, soja e tomate.

flutriafol



Flutriafol SC

500 g a.i/L

Fungicida sistêmico, do grupo químico triazol, caracterizado pelo mecanismo de ação denominado IBE (Inibidor da Biossíntese do Esterol), grupo G1, age mais especificamente no sítio-alvo inibindo a demetilação do C14, segundo classificação internacional do FRAC (Comitê de Ação à Resistência de Fungicidas). É apresentado na formulação como suspensão concentrada, com recomendação de uso para o controle dos alvos biológicos nas culturas do abacate, abacaxi, abóbora, abobrinha, algodão, alho, amendoim, anônaceas (laralim, alemão, cherimóia, fruta-do-conde, graviola e pinha), aveia, azeitona, banana, batata, batata-doce, batata yacon, berinjela, beterraba, cacau, café, canola, cará, cebola, cenoura, centeio, cevada, chalota, chuchu, cupuaçu, ervilha, feijão, feijão-caupi, feijão-vagem, gengibre, gergelim, girassol, grão-de-bico, guaraná, inhame, jiló, kiwi, lentilha, laranja, linhaça, macadâmia, mamão, mamona, mandioca, mandiocinha-salsa, manga, maracujá, maxixe, melancia, melão, nabo, noz-pecã, pepino, pimenta, pimentão, quiabo, rabanete, romã, soja, trigo, triticale e tomate.

glove



Difenoconazol + Ciproconazol EC

250 g a.i./L + 150 g a.i./L

Fungicida de ação sistêmica, composto por dois ingredientes ativos, difenoconazol e ciproconazol, do grupo químico dos triazóis. O produto é recomendado no controle das principais doenças das culturas da soja: ferrugem, oídio e manchas foliares, causadoras da DFC.

iprodone



Iprodione SC

500 g a.i./L

Fungicida de contato do grupo das dicarboxamidas, caracterizado pelo mecanismo de ação denominado "transdução do sinal osmótico" (E3), age mais especificamente no sítio-alvo MAP/Histidina-cinase, segundo classificação internacional do FRAC (Comitê de Ação à Resistência de Fungicidas). É indicado para o controle de doenças por meio de pulverização nas culturas da acelga, acerola, agrião, alface, algodão, alho, almeirão, ameixa, amendoim, amora, aveia, azeitona, batata, café, caju, caqui, carambola, cebola, centeio, cevada, chalota, chicória, crisântemo, ervilha, espinafre, estêvia, feijão, feijões, figo, framboesa, goiaba, grão-de-bico, kiwi, lentilha, mangaba, marmelo, mirtilo, morango, mostarda, nectarina, nêspera, pera, pêssego, pitanga, rúcula, seriguela, soja, trigo, triticale, uva e uva de mesa e no tratamento de sementes de aveia, centeio, cevada, trigo e triticale.

kenja

Isometamida SC

400 g a.i./L

Fungicida com ação de contato e translaminar, que age na inibição da respiração dos fungos. Deve ser utilizado em pulverização nas culturas de algodão, alface, batata, cebola, feijão, maçã, soja, tomate e uva.

piraclostrobin



Piraclostrobina EC

250 g a.i./L

Fungicida sistêmico do grupo químico das estrobilurinas que atua como inibidor do transporte de elétrons nas mitocôndrias das células dos fungos, inibindo a formação de ATP, essencial nos processos metabólicos dos fungos. Apresenta excelente ação protetiva, pois atua na inibição da germinação dos esporos, no desenvolvimento e na penetração dos tubos germinativos, além de proporcionar maior atividade metabólica da planta e aumento da atividade da enzima nitrato redutase, resultando em melhor sanidade da planta. É indicado para as culturas do algodão, alho, amendoim, aveia, banana, batata, café, cana-de-açúcar, cebola, cenoura, cevada, citros, crisântemo, eucalipto, feijão, maçã, mamão, manga, melancia, melão, milho, pepino, pimentão, rosa, soja, tomate, trigo e uva.

propiconazole 500EC



Propiconazol EC

500 g a.i./L

Fungicida sistêmico inibidor da demetilação (DMI), cujo mecanismo de ação é conhecido como "Inibidores da Síntese de Ergosterol" (IBEs), apresentado na formulação como concentrado emulsionável que oferece ação preventiva e curativa em diversos alvos biológicos, os quais causam danos à produção das culturas do alho, amendoim, arroz, arroz irrigado, aveia, banana, café, centeio, cevada, feijão, feijões, gladiolo, grão-de-bico, lentilha, milho, seringueira, sorgo, trigo e triticale.

protection



Tiofanato-metílico + Fluazinam SC

400 g a.i./L + 200 g a.i./L

Fungicida sistêmico e de contato pertencente aos grupos químicos fenilpiridinilamina e benzimidazol apresentado na formulação de Suspensão Concentrada (SC). É indicado para controle de alvos biológicos, os quais causam consideráveis danos à produção das culturas do feijão, maçã, soja e tomate.

scudeiro



Protioconazol + Tebuconazol SC

175 g a.i./L + 300 g a.i./L

Mistura de dois fungicidas sistêmicos, o protioconazol e o tebuconazol. É indicado para o controle de doenças na cultura do algodão, aveia, centeio, cevada, milho, sorgo, trigo e triticale.

tebuco 430 SC



Tebuconazol SC

430 g a.i./L

Fungicida sistêmico, do grupo químico triazol, caracterizado pelo mecanismo de ação denominado IBE (Inibidor da Biossíntese do Ergosterol), grupo G1, age mais especificamente no sítio-alvo inibindo a demetilação do C14, segundo classificação internacional do FRAC (Comitê de Ação à Resistência de Fungicidas). Apresenta ação preventiva e curativa nos biológicos que causam consideráveis danos à produção das culturas do algodão, amendoim, arroz, aveia, café, centeio, cevada, ervilha, feijão, feijões, grão-de-bico, lentilha, milho, sorgo, tomate, trigo e triticale.

tebuco A



Azoxistrobina + Tebuconazol SC

125 g a.i./L + 240 g a.i./L

Fungicida de ação sistêmica do grupo químico das estrobilurinas e triazóis. Apresenta ação preventiva e curativa nos alvos biológicos abaixo indicados, os quais causam consideráveis danos à produção das culturas de algodão, amendoim, arroz, arroz irrigado, aveia, banana, batata, café, centeio, cevada, ervilha, feijão, feijões, grão-de-bico, lentilha, milho, soja, sorgo, tomate, trigo e triticale.

tebuco T



Tebuconazol + Trifloxistrobina SC

200 g a.i./L + 100 g a.i./L

Mistura de fungicidas mesostêmico e sistêmico. Apresenta modo de ação dos inibidores do complexo III - citocromo bc1 (ubiquinol oxidase) no sítio Qo, que inibem a respiração mitocondrial dos fungos, no complexo III da respiração celular (Grupo C3), e DMIs (inibidores da desmetilação do C14), que atuam inibindo a biossíntese de ergosterol, importante componente da membrana celular dos fungos (Grupo G1). É indicado para as culturas do abacaxi, abóbora, abobrinha, acelga, acerola, alface, algodão, alho, almeirão, ameixa, amendoim, arroz, aveia, banana, batata, berinjela, beterraba, brócolis, café, cana-de-açúcar, caqui, cebola, cenoura, cevada, chicória, chuchu, citros, couve, couve-chinesa, couve-de-bruxelas, couve-flor, eucalipto, feijão, goiaba, inhame, jiló, maçã, mamão, mandioca, mandioquinha-salsa, manga, maracujá, maxixe, melancia, melão, milho, morango, mostarda, nabo, nectarina, nêspera, pepino, pera, pêssego, pimentão, rabanete, repolho, seriguela, soja, tomate, trigo e uva.

trivial



Protioconazol + Trifloxistrobina SC

175 g a.i./L + 150 g a.i./L

Mistura de fungicidas mesostêmico e sistêmico, composto por trifloxistrobina + protioconazol. A mistura confere atuação em diferentes fases do ciclo de vida do fungo, desde a inibição da germinação dos esporos até o desenvolvimento e penetração dos tubos germinativos nos tecidos foliares. Indicada para as culturas de algodão, feijão, milho, soja e trigo.

INSETICIDA + FUNGICIDA

imidafol



Imidacloprido + Flutriafol SC

225 g a.i./L + 175 g a.i./L

Mistura de fungicida e inseticida de ação sistêmica indicado para o controle de alvos biológicos na cultura do café.

2,4D



2,4-D SL

670 g a.i./L (equivalente ácido de 2,4-D)

Herbicida seletivo, de ação sistêmica, do grupo químico ácido ariloxialcanóico para aplicação em pós-emergência no controle de plantas daninhas infestantes nas culturas de arroz (irrigado e de sequeiro), aveia, café, cana-de-açúcar, centeio, cevada, duboisia, milheto, milho, pastagens, soja, sorgo, trigo e triticale.



Imazetapir + Flumioxazina + Clorimuirom-etílico WG

400 g a.i./kg + 200 g a.i./kg + 100 g a.i./kg

Herbicida não seletivo de ação sistêmica e de contato do grupo químico sulfonilureia, ciclohexenodicarboximida e imidazolinona, recomendado para o controle em pré e pós-emergência das plantas daninhas, na pré-semeadura da cultura da soja.

carfentrazone



Carfentrazone-etílico EC

400 g a.i./L

Herbicida pós-emergente, seletivo condicional de ação não sistêmica, cujo mecanismo de ação consiste inibir a formação da enzima protoporfirinogênio oxidase (PROTOX), que participa na síntese da clorofila. É recomendado para o controle das plantas daninhas nas culturas do algodão, arroz irrigado, batata, café, cana-de-açúcar, citros, mandioca, milho, soja e no manejo outonal.

cletodim oleum



Cletodim EC

240 g a.i./L

Herbicida graminicida, sistêmico, altamente seletivo para as culturas do abacaxi, algodão, alho, amendoim, batata, batata-doce, batata yacon, berinjela, café, cará, cebola, cenoura, citros, feijão, fumo, gengibre, girassol, inhame, jiló, maçã, mandioca, mandioquinha-salsa, melancia, pimenta, pimentão, quiabo, soja, tomate e uva, na pós-emergência destas culturas, e na aplicação em pré-emergência do algodão, milho, soja e do trigo. Indicado para aplicação em manejo na pré-semeadura da soja, para controle do capim-amargoso (*Digitaria insularis*), resistente ao ingrediente ativo glifosato e para controle do capim-branco (*Chloris polydactyla*). Efetivo contra ampla faixa de gramíneas anuais e perenes, apresentando pouca ou nenhuma atividade sobre as plantas daninhas de folhas largas e ciperáceas.

clomazone



Clomazona EC

500 g a.i./L

Herbicida seletivo sistêmico e pré-emergente. Sua aplicação é feita através de pulverização após o plantio, em pré-emergência das plantas daninhas e das culturas de cana-de-açúcar, mandioca e soja.

clorimuirom max



Clorimuirom-Etílico WG

750 g a.i./kg

Herbicida seletivo, sistêmico, de ação em pós-emergência, recomendado para o controle de plantas daninhas de folhas largas infestantes na cultura da soja, tanto no plantio convencional como no plantio direto, e nas entrelinhas das culturas de café, citros, eucalipto, pinus e soja.

DEFENSAR® 720

MSMA SL

720 g a.i./L

Herbicida com ação de contato e translocação, para uso em pós-emergência das plantas daninhas e indicado para as culturas do algodão, cana-de-açúcar e citros.

diuron 500 SC



Diuron SC

500 g a.i./L

Herbicida seletivo de ação sistêmica, pertencente ao grupo químico ureia, com eficiência no controle de plantas daninhas de folhas largas e gramíneas tanto em pré como em pós-emergência precoces. É indicado para as culturas de abacaxi, algodão, café, cana-de-açúcar e citros.

flumioxazin



Flumioxazin SC

500 g a.i./L

Herbicida seletivo de ação não sistêmica. É recomendado para as culturas do algodão, café, cana-de-açúcar, citros, feijão, milho e soja.

fluroxipir



NORTOX

Fluroxipir EC

200 g a.i/L (equivalente ácido de Fluroxipir)

Herbicida seletivo, de ação sistêmica, do grupo químico ácido piridiniloxalcanoico, recomendado para o controle de plantas daninhas nas culturas do algodão, milho, soja e trigo.

fluroxipir 200 EC



NORTOX

Fluroxipir EC

200 g a.i/L (equivalente ácido de Fluroxipir)

Herbicida seletivo, de ação sistêmica, recomendado para o controle de plantas daninhas dicotiledôneas de porte arbustivo e semi-arbustivo em pastagens.

fluroxipir P



NORTOX

Fluroxipir + Picloram ME

80 g a.i/L (equivalente ácido de Fluroxipir); 80 g a.i/L (equivalente ácido de Picloram)

Herbicida seletivo, de ação sistêmica, recomendado para o controle de plantas daninhas dicotiledôneas de porte herbáceo, semi-arbustivo e arbustivo em áreas de pastagens de gramíneas forrageiras dos gêneros *Bracharia* e *Panicum*.

glifosato 720 WG



NORTOX

Glifosato WG

720 g a.i/kg (equivalente ácido de Glifosato)

Herbicida não seletivo, de ação pós-emergente, apresentado como grânulos dispersíveis em água. Devido a suas propriedades sistêmicas, permite o controle total das plantas daninhas, monocotiledôneas e dicotiledôneas, que são atingidas na parte aérea e nas raízes pela ação do herbicida. Indicado para as culturas do algodão, algodão OGM, ameixa, arroz, aveia, banana, cacau, café, caju, cana-de-açúcar, caqui, carambola, castanha-do-pará, centeio, cevada, citros, coco, cupuaçu, dendê, ervilha, eucalipto, feijão, feijões, figo, fumo, goiaba, grão-de-bico, guaraná, kiwi, lentilha, litchia, maçã, macadâmia, mamão, manga, mangaba, maracujá, marmelo, milheto, milho, milho OGM, nectarina, nêspera, pastagens, pera, pêssego, pinus, soja, soja OGM, sorgo, triticale, trigo e uva.

glifosato ultra



NORTOX

Glifosato SL

533,53 g a.i/L (equivalente ácido Glifosato)

Herbicida não seletivo, de ação pós-emergente, apresentado como concentrado solúvel. Devido a suas propriedades sistêmicas, permite o controle total das plantas daninhas, monocotiledôneas e dicotiledôneas, que são atingidas na parte aérea e nas raízes pela ação do herbicida. Indicado para as culturas do abacate, abacaxi, açaí, algodão, algodão OGM, ameixa, amendoim, anônaceas, arroz, aveia, azeitona, banana, cacau, café, caju, cana-de-açúcar, caqui, carambola, castanha-do-pará, centeio, cevada, citros, coco, cupuaçu, dendê, ervilha, eucalipto, feijão, feijões, figo, fumo, goiaba, grão-de-bico, guaraná, kiwi, lentilha, litchia, maçã, macadâmia, mamão, manga, mangaba, maracujá, marmelo, milheto, milho, milho OGM, nectarina, nêspera, noz-pecã, pastagens, pera, pêssego, pinhão, pinus, pupunha, romã, seringueira, soja, soja OGM, sorgo, trigo, triticale e uva.

glufosinato 880SG



NORTOX

Glufosinato SG

880 g a.i/L

Herbicida não seletivo utilizado no controle de plantas daninhas da cultura do algodão, milho, soja e, ainda, como dessecante nas culturas do algodão e soja.

hexazinona



NORTOX

Hexazinona SL

250 g a.i/L

Herbicida seletivo, de ação sistêmica, com eficiência no controle de plantas daninhas, de folhas largas e gramíneas, tanto em pré como em pós-emergência precoces na cultura da cana-de-açúcar. Pode ainda ser utilizado em aplicação pós-emergência na modalidade de "catação" em jato dirigido às touceiras das plantas daninhas.

hexazinona-D



NORTOX

Hexazinona + Diurom WG

132 + 468 g a.i/kg

Herbicida seletivo de ação sistêmica com eficiência no controle de plantas daninhas de folhas largas e gramíneas, tanto em pré como em pós-emergência, precoces infestantes na cultura da cana-de-açúcar. Pode ainda ser utilizado em aplicação pós-emergência na modalidade de "catação" em jato dirigido às touceiras das plantas daninhas.

imazaduo



NORTOX

Imazapir + Imazapique WG

525 + 175 g a.i/kg

Herbicida sistêmico à base dos ingredientes ativos imazapique e imazapir, indicado para as culturas de arroz e soja OGM tolerantes a imidazolinonas e pastagem. Possui amplo espectro de controle das principais plantas daninhas infestantes das culturas da soja OGM, apresentando flexibilidade quanto à época de aplicação, podendo ser utilizado desde a pós-emergência inicial até a pós-emergência normal das plantas infestantes da soja.

imazaquim ultra



NORTOX

Imazaquim SL

150 g a.i/L (equivalente ácido de Imazaquim)

Herbicida seletivo de ação sistêmica, aplicado em pré e pós-emergência, para controle de plantas daninhas de folhas largas infestantes na cultura da soja.

imazetapir



NORTOX



Imazetapir SL

200 g a.i/L (equivalente ácido de Imazetapir)

Herbicida seletivo, sistêmico, de ação pré e pós-emergência do grupo químico imidazolinona, para controle de plantas daninhas de folhas largas e gramíneas infestantes na cultura do amendoim, arroz irrigado, ervilha, feijão, feijões, grão-de-bico, lentilha, pastagem e soja. É indicado para a cultura da soja, no sistema de plantio direto e convencional.

mesotriona



NORTOX

Mesotriona SC

480 g a.i/L

Herbicida seletivo sistêmico, pós-emergente, apresentado na formulação de suspensão concentrada. Sua aplicação é feita por meio de pulverização após o plantio, em pós-emergência das plantas daninhas e das culturas de cana-de-açúcar (cana-planta e cana-soca) e milho convencional, proporcionando perfeito controle de plantas daninhas dicotiledôneas, bem como as gramíneas.

mesotriona cana



Mesotriona SC
480 g a.i/L
Herbicida seletivo sistêmico, pós-emergente, apresentado em formulação de suspensão concentrada. A aplicação é realizada após o plantio, em pós-emergência das plantas daninhas e da cultura de cana-de-açúcar (cana-planta e cana-soca).

metsulfuron



Metsulfuron Metílico WG
600 g a.i./kg
Herbicida seletivo e de ação sistêmica, rapidamente absorvido através de folhas e raízes, com translocação por toda a planta. Age inibindo a enzima acetolactato sintase (ALS) responsável pela síntese dos aminoácidos valina, leucina e isoleucina. Também é utilizado para o controle em pré-emergência de plantas daninhas da cana-de-açúcar e em pós-emergência das plantas das seguintes culturas: arroz, arroz irrigado, aveia (aveia branca e preta), café, cana-de-açúcar, cevada, citros, coco e dendê, manejo de inverno, pastagens, trigo e triticle (pré-semeadura do trigo).

nicosulfuron 750 WG



Nicosulfuron WG
750 g a.i/kg
Herbicida seletivo e sistêmico do grupo das sulfonilureias, utilizado em pós-emergência no controle de plantas daninhas monocotiledôneas e dicotiledôneas que infestam a cultura do milho e no manejo/dessecação das plantas daninhas no pré-plantio da cultura da soja.

norton



2,4 D + Picloram SL
240 g a.i/L (equivalente ácido de 2,4-D); 64 g i.a/L (equivalente ácido de Picloram)
Herbicida seletivo sistêmico, de pós-emergência, pertencente ao grupo químico ácido piridinocarboxílico, recomendado para controle de plantas infestantes na cultura do arroz e para o controle de plantas daninhas dicotiledôneas de portes arbóreo, arbustivo e subarbusivo em pastagens e para a erradicação de eucalipto na reforma de áreas florestais.

picloram cana



Picloram SL
240 g a.i/L (equivalente ácido de Picloram)
Herbicida seletivo sistêmico, de pós-emergência, pertencente ao grupo químico ácido piridinocarboxílico. Recomendado para controle de plantas infestantes na cultura do arroz irrigado e da cana-de-açúcar, e para o controle de plantas daninhas dicotiledôneas de portes arbóreo, arbustivo e subarbusivo em pastagens.

picloram



Picloram SL
240 g a.i/L (equivalente ácido de Picloram)
Herbicida sistêmico e seletivo, recomendado para controle de plantas daninhas que infestam a cultura do arroz irrigado. É indicado também para o controle de plantas daninhas dicotiledôneas de porte arbóreo, arbustivo e sub-arbusivo em pastagem.



2,4 D + Picloram SL
240 g a.i/L (equivalente ácido de 2,4-D); 64 g i.a/L (equivalente ácido de Picloram)
Herbicida seletivo sistêmico, de pós-emergência, pertencente aos grupos químicos ácido ariloxialcanóico e ácido piridinocarboxílico, recomendado para controle de plantas infestantes na cultura do arroz e para o controle de plantas daninhas dicotiledôneas de portes arbóreo, arbustivo e subarbusivo em pastagens.

Sempra®

Halossulfurom-metílico WG
750 g a.i/Kg
Herbicida seletivo de ação sistêmica do grupo químico sulfonilureia que deve ser aplicado em pós-emergência das culturas e das plantas daninhas. Indicado para as culturas de cana-de-açúcar, feijão e gramados.

s-metolaclo-ro



S-metolaclo-ro EC
960 g a.i/L
Caracteriza-se pela ação sobre monocotiledôneas acentuada, notadamente sobre as espécies anuais, com forte ação sobre a trapoeira e algumas espécies de dicotiledôneas. O ingrediente ativo s-metolaclo-ro é absorvido através do coleóptilo das monocotiledôneas e hipocótilo das dicotiledôneas e atua na gema terminal, inibindo o crescimento das plantas. O sintoma do efeito herbicida sobre as plantas sensíveis caracteriza-se pelo intumescimento dos tecidos, e pelo enrolamento do caulículo nas monocotiledôneas, e nas dicotiledôneas observa-se a clorose, necrose e a morte. A maioria das plantas, porém, morre antes de emergir à superfície do solo. Indicado para as culturas de algodão, cana-de-açúcar, canola, feijão, girassol, milho e soja.

terbutilazina



Terbutilazina SC
500 g a.i/L
Herbicida seletivo de ação sistêmica, do grupo químico das triazinas. Recomendado para o controle em pré e pós-emergência precoce e inicial de plantas infestantes na cultura do milho.

triclopir



Triclopir EC
480 g a.i/L (equivalente ácido de triclopir)
Herbicida seletivo, de ação sistêmica, do grupo químico ácido piridiniloxialcanóico, recomendado para o controle de plantas daninhas em arroz irrigado, eucalipto, pastagens e soja.

triclopir F



Triclopir + Fluroxipir EC
240 g a.i/L (equivalente ácido de Triclopir); 80 g a.i/L (equivalente ácido de Fluroxipir)
Herbicida seletivo, de ação sistêmica, recomendado para o controle de plantas daninhas dicotiledôneas de portes arbustivo e semi-arbusivo em áreas de pastagens de gramíneas forrageiras. É recomendado também para o controle de plantas daninhas de folhas largas nas culturas de cana-de-açúcar, pinus e soja, e também em rebrotes de eucalipto em áreas de floresta de eucalipto.

HERBICIDAS

trifluralina gold



Trifluralina EC

450 g a.i./L

Herbicida seletivo, de ação não sistêmica, do grupo químico dinitroanilina. A aplicação deve ser realizada em pré-emergência das plantas daninhas e das culturas. É indicado para as culturas de arroz, amendoim, ervilha, feijão, feijão-caupi, grão-de-bico, lentilha, milho, soja e sorgo, tanto no sistema de plantio direto como no convencional. O herbicida é recomendado também para cultura do algodão, cana-de-açúcar, eucalipto e seringueira, no sistema de plantio convencional. Para as culturas da cevada, aveia, centeio, trigo e triticale, no sistema plantio direto, o produto é recomendado tanto em pré como na pós-emergência das culturas. É para as culturas da cevada, aveia, centeio, trigo e triticale no sistema de plantio direto.

trifluralina H



Trifluralina + Hexazinona EC

400 + 100 g a.i./L

Herbicida pré-emergente, de ação sistêmica e seletivo para cultura da cana-de-açúcar. É recomendada aplicação após o plantio, em pré-emergência da cultura e das plantas daninhas. Proporciona controle de plantas daninhas de folha larga e folha estreita.



ADJUVANTES

óleo vegetal ad



Óleo Vegetal EC

930 g/L

Óleo vegetal emulsionável para uso como adjuvante, recomendado para ser adicionado à calda dos herbicidas, fungicidas e inseticidas que requerem o uso de produtos com essa finalidade.

REGULADORES DE CRESCIMENTO

sulfometuron



Sulfometuron WG

750 g a.i./Kg

Regulador de crescimento do grupo químico das sulfonilureias, sistêmico, recomendado como maturador para a cultura da cana-de-açúcar.

PROTETOR DE SEMENTES

fluxofenim



Fluxofenim EC

500 g a.i./L

Adjuvante/protetor de sementes recomendado para proteção das sementes de sorgo contra a ação fitotóxica do herbicida S-metolaclozoro Nortox.





PODE CONFIAR.
É DA NORTOX.



ATENÇÃO. Produto perigoso à saúde humana, animal e ao meio ambiente. Antes de armazenar ou utilizar este produto, leia atentamente e siga todas as recomendações constantes no rótulo, bula e receita agrônômica. Destine corretamente as embalagens vazias. Utilize equipamentos de proteção individual e mantenha este produto longe do alcance de crianças e animais. Consulte sempre um Engenheiro Agrônomo. Venda sob receituário agrônômico.



nortox.com.br



[@nortoxsa](https://www.instagram.com/nortoxsa)



[/nortox-sa](https://www.linkedin.com/company/nortox-sa)



[/nortoxbrasil](https://www.facebook.com/nortoxbrasil)



[/nortoxsa](https://www.youtube.com/nortoxsa)